

Dr Jordan BAILLY - Dr G r ald BAUDRY - Dr J r my BAYET - Dr Jordan BONSIGNORE - Dr Pierre BOUCHER - Dr Marc BOUCHET -
Dr La titia BURNOL - Dr Laurane CHALVET - Dr Beno t CREMILLIEUX - Dr Magalie DUMAS - Dr Micha l FAURE -
Dr Julie GALLAND - Dr L andre GIRARD - Dr Luca GUIZOUARN - Dr Matthis LEONARD - Dr J r my MALLARD - Dr Jean PASCAL - Dr Marc VERCURYSSE

39, boulevard de la Palle
42030 SAINT-ETIENNE Cedex 2
T l : 04.77.42.27.00

DOCUMENT D'INFORMATION MEDICALE SUR L'ANESTHESIE

Ce document est destin     vous informer sur l'anesth  sie, ses avantages et ses risques.

Nous vous demandons de le lire attentivement, afin de pouvoir donner votre consentement   la proc  dure anesth  sique qui vous sera propos  e par le m  decin anesth  siste-r  animateur.

Vous pourrez  galement poser   ce m  decin des questions sur cette proc  dure.

Pour les questions relatives   l'acte qui motive l'anesth  sie, il appartient au sp  cialiste qui r  alisera cet acte d'y r  pondre.

✓ QU'EST-CE QUE L'ANESTHESIE ?

L'anesth  sie est un ensemble de techniques qui permet la r  alisation d'un acte chirurgical, obst  trical ou m  dical (endoscopie, radiologie, etc...), en supprimant ou en att  nuant la douleur.

Il existe deux grands types d'anesth  sie : l'anesth  sie g  n  rale ou l'anesth  sie loco-r  gionale.

L'anesth  sie g  n  rale est un  tat comparable au sommeil, produit par l'injection de m  dicaments, par voie intraveineuse et/ou par la respiration de vapeurs anesth  siques,   l'aide d'un dispositif appropri  .

L'anesth  sie loco-r  gionale permet, par diff  rentes techniques, de n'endormir que la partie de votre corps sur laquelle se d  roulera l'op  ration. Son principe est de bloquer les nerfs de cette r  gion, en injectant   leur proximit   un produit anesth  sique local. Une anesth  sie g  n  rale peut  tre associ  e ou devenir n  cessaire, notamment en cas d'insuffisance de l'anesth  sie loco-r  gionale.

La rachianesth  sie et l'anesth  sie p  ridurale sont deux formes particuli  res d'anesth  sie loco-r  gionale, o   le produit anesth  sique est inject     proximit   de la mo  lle  pini  re et des nerfs qui sortent de celle-ci.

Toute anesth  sie, g  n  rale ou loco-r  gionale, r  alis  e pour un acte non urgent, n  cessite une consultation, plusieurs jours   l'avance et une visite pr  anesth  sique la veille ou quelques heures avant l'anesth  sie, selon les modalit  s d'hospitalisation. Comme l'anesth  sie, elles sont effectu  es par un m  decin anesth  siste-r  animateur. Au cours de la consultation et de la visite, vous  tes invit  (e)   poser les questions que vous jugerez utiles   votre information.

Le choix du type d'anesth  sie sera d  termin   en fonction de l'acte pr  vu, de votre  tat de sant   et du r  sultat des examens compl  mentaires  ventuellement prescrits. Le choix final rel  ve de la d  cision et de la responsabilit   du m  decin anesth  siste-r  animateur qui pratiquera l'anesth  sie.

✓ COMMENT SEREZ-VOUS SURVEILLE(E) PENDANT L'ANESTHESIE ET   VOTRE REVEIL ?

L'anesth  sie, quel que soit son type, se d  roule dans une salle  quip  e d'un mat  riel ad  quat, adapt     votre cas et v  rifi   avant chaque utilisation. Tout ce qui est en contact avec votre corps est soit   usage unique, soit d  sinfect   ou st  rilis  . En fin d'intervention, vous serez conduit(e) dans une salle de surveillance post-interventionnelle (salle de r  veil) pour y  tre surveill  (e) de mani  re continue avant de regagner votre chambre ou de quitter l' tablissement.

Durant l'anesth  sie et votre passage en salle de surveillance post-interventionnelle, vous serez pris(e) en charge par un personnel infirmier qualifi  , sous la responsabilit   d'un m  decin anesth  siste-r  animateur.

✓ QUELS SONT LES RISQUES DE L'ANESTHESIE ?

Tout acte m  dical, m  me conduit avec comp  tence et dans le respect des donn  es acquises de la science, comporte un risque. Les conditions actuelles de surveillance de l'anesth  sie et de la p  riode du r  veil, permettent de d  pister rapidement les anomalies et de les traiter.

✓ QUELS SONT LES INCONVENIENTS ET LES RISQUES DE L'ANESTHESIE GENERALE ?

Les naus  es et les vomissements au r  veil sont devenus moins fr  quents avec de nouvelles techniques et les nouveaux m  dicaments. Les accidents li  s au passage de vomissements dans les poumons sont tr  s rares si les consignes de je  ne sont bien respect  es.

L'introduction d'un tube dans la trach  e (intubation) ou dans la gorge (masque laryng  ) pour assurer la respiration pendant l'anesth  sie peut provoquer des maux de gorge ou un enrouement passager.

Des traumatismes dentaires sont  galement possibles. C'est pourquoi il est important que vous signaliez tout appareil ou toute fragilit  

Une rougeur douloureuse au niveau de la veine dans laquelle les produits sont injectés peut s'observer. Elle disparaît en quelques jours.

Des troubles passagers de la mémoire ou une baisse des facultés de concentration peuvent survenir dans les heures suivant l'anesthésie.

La position prolongée sur la table d'opération peut entraîner des compressions, notamment de certains nerfs, ce qui peut provoquer un engourdissement ou, exceptionnellement, la paralysie d'un bras ou d'une jambe.

Dans la majorité des cas, les choses rentrent dans l'ordre en quelques jours ou quelques semaines.

Pour donner un ordre de grandeur, des complications sérieuses ne surviennent que sur plusieurs centaines de milliers d'anesthésies. Des complications imprévisibles comportant un risque vital comme une allergie grave, un arrêt cardiaque, une asphyxie, sont extrêmement rares.

✓ **QUELS SONT LES INCONVENIENTS ET LES RISQUES DE L'ANESTHESIE LOCO-REGIONALE ?**

Après une rachianesthésie ou une anesthésie péridurale, des maux de tête peuvent survenir. Ils nécessitent parfois un repos de plusieurs jours ou/et un traitement local spécifique. Une paralysie transitoire de la vessie peut nécessiter la pose temporaire d'une sonde urinaire.

Des douleurs au niveau du point de ponction dans le dos sont également possibles. Une répétition de la ponction peut être nécessaire en cas de difficultés. Des démangeaisons passagères peuvent survenir lors de l'utilisation de la morphine ou de ses dérivés.

Très rarement, on peut observer une baisse transitoire de l'acuité auditive ou visuelle.

En fonction des médicaments associés, des troubles passagers de la mémoire ou une baisse des facultés de concentration peuvent survenir dans les heures suivant l'anesthésie.

Des complications plus graves comme des convulsions, arrêt cardiaque, une paralysie permanente ou une perte plus ou moins étendue des sensations sont extrêmement rares. Quelques cas sont décrits, alors que des centaines de milliers d'anesthésies de ce type sont réalisées chaque année.

Au cours de l'anesthésie loco-régionale en ophtalmologie, un traumatisme de globe oculaire est exceptionnel.

✓ **QU'EN EST-IL DE LA TRANSFUSION SANGUINE ?**

S'il existe une probabilité que vous soyez transfusé(e) pendant votre opération, vous recevrez une information spécifique sur les techniques et le risque transfusionnel.

✓ **ORGANISATION DU SERVICE D'ANESTHESIE :**

Pour une meilleure organisation des soins et pour augmenter la sécurité, les anesthésistes-réanimateurs travaillent en équipe.

Le médecin qui pratique l'anesthésie n'est pas obligatoirement le même que celui que vous avez rencontré en consultation pré-anesthésique.

Néanmoins, l'anesthésiste-réanimateur consultant a pris la précaution de transmettre votre dossier à son confrère qui vous prend en charge. De même, au cours de la période pré-opératoire, vous pourrez être amené(e) à rencontrer d'autres membres de l'équipe d'anesthésie-réanimation.

Un anesthésiste ne passera pas systématiquement dans votre chambre après l'opération. Par contre un médecin anesthésiste réanimateur est présent sur le site 24 h sur 24 pour répondre à tout problème anesthésique éventuel.

Toutes les questions sur la chirurgie sont à poser au chirurgien.

ACCORD POUR LA PROCEDURE ANESTHESIQUE

A compléter après lecture de la fiche et à rapporter le jour de l'hospitalisation pour joindre au dossier médical

Nom prénom patient : Date d'entrée : / /

Au cours de la consultation pré-anesthésique, j'ai été informé(e) des avantages et des risques de l'anesthésie.

J'ai pu poser toutes les questions que j'ai jugées utiles et j'ai bien compris les réponses qui m'ont été fournies.

J'accepte les modifications de méthodes qui pourraient s'avérer nécessaires pendant l'intervention.

Mon accord concerne aussi la transfusion de sang ou des dérivés sanguins jugés indispensables par le médecin-réanimateur.

Cette prise en charge donnera lieu à un dépassement d'honoraires de Euros qui sera à régler à l'admission à la

Clinique ; il peut être pris en charge totalement ou en partie par certaines mutuelles.

NOM et signature du patient (ou des représentants légaux si l'enfant est mineur)

Précédée de la phrase : LU ET APPROUVE

Patient :

Si mineur :

Titulaire autorité 1 :

Titulaire autorité 2